

# Pomme de Terre

Ministère de l'Agriculture Service Régional de la Protection des Végétaux

Allée de la Croix Rompue 518, rue St Fuscien 80092 AMIENS CEDEX 3 Tél: 03.22.33.55.97 Fax: 03.22.33.55.56 E-mail: srpv.drafpicardie@agriculture.gouv.fr Notre site: www.srpvpicardie.com

Bulletin réalisé avec la participation de la FREDON Picardie par délégation (art. L252-1 à

fImprimé à la station
d'Avertissements
Agricoles d'AMIENS
Directeur gérant :
Christophe MARTINET
Publication périodique
C.P.P.A.P n°1823AD

Tarif Courrier 59 €

Tarif Fax 59€

Tarif E-mail 57 €

# AVERTISSEMENTS 111182

# AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

## **PICARDIE**

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 18 du 17 août 2004 - 01 page

# Phénologie

Stade: sénescence - récolte.

# Mildiou

### Situation sanitaire

On recommence une semaine identique à la semaine dernière avec des conditions climatiques favorables au mildiou. Le début de la décoloration des feuilles masque parfois des symptômes de mildiou.

### Le coin des modèles

Les données du modèle MILSOL confirme une augmentation du risque mildiou.

Le potentiel de sporulation reste important sur la majorité des postes. Seuls Attilly, Forté et Vic sur Aisne présentent un potentiel de sporulation faible.

D'après GUNTZ-DIVOUX, des contaminations importantes sont enregistrées du 12 au 16/08 suivant les postes.

Situation épidémiologique poste par poste du 17 août

Des sorties de taches théoriques sont prévues le 17/08 ou le 18/08 suivant les secteurs.

### **Préconisations**

Quel que soit le potentiel de sporulation et sur toutes les variétés, il est impératif de renouvelez votre traitement à 7 jours ou après lessivage.

En raison des conditions climatiques actuelles, nous conseillons, d'utiliser un produit non lessivable et ayant une action renforcée sur la protection du tubercule (matière active de type cyazofamide, fluazinam, zoxamide...).

Maintenir la protection fongicide jusqu'à dessiccation complète de la végétation. Utilisez un dithiocarbamate en l'absence de mildiou, dans le cas contraire employez une des matières actives citées ci-dessus.

# > Sur les parcelles maintenues en végétation (fécules)

Poursuivez votre protection avec un contact à base de dithiocarbamate.

Postes climatiques	Génération	Pluie du 10/08 au 16/08	Date de dernières contaminations (depuis le précédent bulletin)	Date prévue de sortie de tache	Potentiel de sporulation
Amiens	10 ème	29 mm	10-13-15et16/08	17/08	fort
Attilly	11 ème	23.5 mm	12-13/08	à partir du 18/08	faible
Ebouleau	13 ème	34.5 mm	12aul 6/08	à partir du 18/08	fort
Forte	11 ème	41 mm	12-13et16/08	à partir du 18/08	faible
Abbeville (Inval)	13 ème	41 mm	10 au 16/08	à partir du 17/08	fort
Marcelcave	11 ème	14.5 mm	10 au 16/08	à partir du 17/08	fort
Saint Just en Chaussée	11 ème	32 mm	12 au 16/08	à partir du 17/08	fort
Vauvillers	10 ème	21 mm	10-13 et 16/08	à partir du 17/08	moyen
Verdilly	11 ème	31 mm	12 au 15/08	à partir du 18/08	moyen
Vic sur Aisne	9 ème	29.5 mm	12 au 14/08	à partir du 18/08	faible
Villeroy	11 ème	16 mm	12 et 13/08	à partir du 18/08	moyen
Villers Bocage	12ème	32.5 mm	12-13-15 et 16/08	à partir du 18/08	fort
Villiers le Sec	10 ème	19.5 mm	12-13 et 16/08	à partir du 18/08	moyen



### Mildiou:

Le risque reste important, Maintenez la protection.

### Pucerons:

Aucun traitement ne se justifie.

P104